

# **Animedazon spray 2.45%**

*Spray cutanat suspensie pentru bovine, ovine si suine*

## **COMPOZITIE**

Fiecare tub de spray contine:

Clorhidrat de clortetraciclina 3,210 g

Patent Blue V 85% (E 131) 0,23 g

Izobutan 92,2 g

## **INDICATII**

Tratamentul leziunilor traumatice sau chirurgicale superficiale contaminate cu agenti sensibili la clortetreaciclina. Produsul poate fi utilizat ca parte a tratamentului pentru infectii superficiale ale pielii si copitelor, mai ales dermatita interdigitala (ologeala si picior infectat) si dermatita digitala cauzata de microorganism sensibile la clortetraciclina.

## **DOZE SI MOD DE ADMINISTRARE**

Animedazon spray este indicat pentru administrarea cutanata. Agitati bine recipientul inainte de pulverizare. Recipientul trebuie tinut la o distanta de aproximativ 15-20 cm de suprafata care urmeaza sa fie pulverizata; pulverizati timp de 3 secunde, pana cand zona supusa tratamentului este colorata uniform. In cazul infectiilor la copita, acest tratament trebuie repetat dupa 30 de secunde. Pentru tratamentul leziunilor superficiale contaminate cu agenti sensibili la clortetraciclina se recomanda o singura administrare.

Pentru tratamentul dermatitei digitale se recomanda doua administrari la un interval de 30 de secunde timp de 3 zile consecutive, o data sau de doua ori pe zi.

Pentru tratamentul celorlate infectii ale copitei ( ologeala si picior infectat) se recomanda administrarea cu un interval de 30 de secunde, o data sau de doua ori pe zi. In functie de gravitatea leziunii si rata de ameliorare, tratamentul trebuie repetat in interval de 1- 3 zile.

Cititi prospectul inainte de utilizare.

## **TIMP DE ASTEPTARE**

Carne si organe: 0 zile

Lapte: 0 zile

## **ATENTIONARI SPECIALE**

Cititi prospectul inainte de utilizare.

Partea patata a pielii porcului trebuie indepartata inainte ca restul animalului sa fie utilizat pentru coonsum uman.

### **CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE**

Recipient sub presiune: a se proteja de lumina soarelui si anu se expune la o temperature mai mare de 50 de grade Celsius. A nu se pastra la o temperatura mai mare de 25 de grade Celsius. A nu se refrigera sau congeal. A nu se perfora sau arde, nici macar dupa utilizare. Nu pulverizati produsul pe o flacara deschisa sau pe un material incascent. A se feri de sursele de aprindere-fumatul interzis.

**Numele detinatorului autorizatiei de comercializare: aniMedica GmbH**